



مبادئ توجيهية تحليلية:

إنشاء محددات الإعاقة وفق النظم اللغوية للحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية باستخدام مجموعة تأدية الوظائف القصيرة – المعززة الصادرة عن فريق واشنطن

مقدمة

تشمل وثائق التنفيذ الخاصة بفريق واشنطن الأدوات التي استحدثها الفريق بشأن إحصاءات الإعاقة بغية جمع بيانات الإعاقة ذات المقارنة عالمياً بخصوص التعدادات والمسوح. تتناول الوثائق المذكورة أفضل الممارسات في تنفيذ المجموعة القصيرة، والمجموعة الموسعة،

والمجموعة القصيرة

المعززة، وكذلك وحدات تأدية الوظائف لدى الطفل الصادرة عن فريق واشنطن / اليونيسف للأطفال في الفئة العمرية بين 2 و4 أعوام والفئة بين 5 و17 عاماً، وكذلك وحدة الإعاقة للدراسات الاستقصائية للقوى العاملة الصادرة عن فريق واشنطن / منظمة العمل الدولية، علاوة على أدوات الفريق الأخرى. تشمل الموضوعات: الترجمة، ومواصفات الأسئلة، والمبادئ التوجيهية التحليلية، ورمز البرمجة للتحليلات، واستخدام الأدوات لأغراض التفصيل، وغير ذلك.

للعثور على وثائق تنفيذ أخرى ومزيد من المعلومات الصادر عن فريق واشنطن، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للفريق:

<http://www.washingtongroup->

[/disability.com](http://www.washingtongroup-)

<http://www.washingtongroup->

النظم اللغوية للحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية الخاص بالمجموعة القصيرة – المعززة الصادرة عن فريق واشنطن بشأن تأدية الوظائف (المجموعة القصيرة المعززة) مأخوذ من النظم اللغوية المستحدث للمجموعة الموسعة الصادرة عن الفريق نفسه بشأن تأدية الوظائف (المجموعة الموسعة).

يستند تعريف الإعاقة في المجموعة القصيرة المعززة إلى مستوى الشمول الذي يتحدد بمجال / سؤال واحد الأقل يحمل تصنيف "صعوبة كبيرة" أو "لا يمكنني القيام بذلك على الإطلاق" – أو بالمستوى الأعلى من الصعوبة وفق مقياس رباعي النقاط بالنسبة لمجالات "الجزع" و"الاكتئاب".

تتألف المجموعة القصيرة المعززة من المجموعة القصيرة بالإضافة إلى تأدية الوظائف للجزء العلوي من الجسم ومجالي "الجزع" و"الاكتئاب": أي بإجمالي 12 سؤالاً موزعة على 9 مجالات من تأدية الوظائف.

ملاحظة: استعن بأساليب الموازنة والتقدير المعيارية لديك عند التحليل.

يستند النظم اللغوي لمكونات الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية إلى علامات/المتغيرات وعلامات/القيمة الموضحة في الجداول أدناه. تشمل وحدة المجموعة القصيرة المعززة الكاملة أسئلة أكثر مما يحويه هذا الجدول. تتحدد حالة الإعاقة عبر درجة الصعوبة في الأنشطة الأساسية والعامة بدون استخدام تقنية مساعدة أو أية مساعدة أخرى. الأسئلة المتعلقة بأدوية أعراض الجزع أو الاكتئاب غير مدرجة ضمن المتغيرات التحليلية المعتبرة في النظم اللغوي.

الأسئلة / المتغيرات المبينة أدناه هي وحدها المستخدمة في تحديد معرفات الإعاقة.

تأكد من استخدام علامات/المتغيرات والقيم نفسها أو راجع النظم اللغوي لمكونات

الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية حتى تُظهر/العلامات المستخدمة في قاعدة بيانات.

تُدار "المجموعة القصيرة" بوصفها جزءاً من استقصاء للمقابلات المتبعة لدى هيئة الصحة الوطنية الأمريكية. البيانات المستخدمة في إعداد هذه المبادئ التوجيهية مأخوذة من إصدار الهيئة في 2013.

ملاحظة لمستخدمي استقصاء الهيئة: من الوارد أن تختلف أسماء المتغيرات في ملف بيانات الهيئة ووثائقها عن الأسماء المستخدمة في هذه الوثيقة؛ ومن ذلك مثلاً متغير مجال الاعتناء بالنفس المشار إليه بالاختصار (SC-SS) في هذه الوثيقة لأنه مشار إليه بالاختصار (UB_SS) في ملف بيانات الهيئة ووثائقها.

نمط الإجابة	علامة المتغير	أسئلة / مجالات المجموعة الموسعة لفريق واشنطن
		النظر
1	VIS_SS	1- هل تواجه صعوبة في النظر حتى وأنت تضع النظارات الطبية؟
		التواصل
1	COM_SS	2- هل تواجه صعوبة في التواصل مع الآخرين باستخدام لغتك المعتادة (كأن يصعب عليك فهم الآخرين أو أن يصعب عليهم فهمك؟)
		السمع
1	HEAR_SS	3- هل تواجه صعوبة في السمع حتى مع استخدام معينات سمعية؟
		الإدراك
1	COG_SS	4- هل تواجه صعوبة في التذكر أو التركيز؟
		الاعتناء بالنفس / الجزء العلوي من الجسم
1	SC_SS	5- هل تواجه صعوبة في (الاعتناء بنفسك مثل) الاستحمام أو ارتداء الملابس؟
1	UB1_	6- هل تواجه صعوبة في رفع قنينة ماء من لترين من الخصر إلى مستوى العينين؟
1	UB2_	7- صعوبة استخدام الأيدي والأصابع
		الحركة
1	MOB_SS	8- هل تواجه صعوبة في المشي أو صعود الدرج؟
		التأثير (الجزء)
2	ANX1_	9- ما معدل تكرار شعورك بالقلق أو الغضب أو التوتر؟
3	ANX3_	10- كيف كان مستوى مشاعرك في أقرب مرة شعرت فيها بالقلق أو الغضب أو التوتر؟
		التأثير (الاكتئاب)
2	DEP1_	11- ما معدل شعورك بالاكتئاب؟
3	DEP3_	12- ما مستوى شعورك بالاكتئاب في أقرب مرة شعرت به؟

ملحوظة: الأحمر يشير إلى المجموعة القصيرة لفريق واشنطن (المجموعة القصيرة).

الأسئلة المعروضة باللون الأحمر مع الأخضر مُدرجة في المجموعة القصيرة المعززة.

	النمط 1	النمط 2	النمط 3*
1	لا توجد صعوبة	يوميًا	قليلاً
2	نعم، توجد بعض الصعوبة	أسبوعياً	كثيراً
3	نعم، توجد صعوبة كبيرة	شهرياً	متوسط ما بين قليلاً وكثيراً
4	لا يمكنني القيام بذلك على الإطلاق	بضع مرات في السنة	
5		مطلقاً	
7	أرفض الإجابة	أرفض الإجابة	
8	غير متأكد	غير متأكد	
9	لا أعرف	لا أعرف	

* لاحظ في النظم اللغوي أدناه أن العناصر ذات نمط الإجابة 6 (3_ANX و 3_DEP) مدونة بحيث تضع "متوسط ما بين" وضعاً عددياً وسيطاً بين "قليلاً" و"كثيراً".

النظم اللغوي للحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية المبين أدناه مشتمل على زوجين من العناصر مختصين بمحتوى المجموعة القصيرة المعززة.

أولاً، كان من الهامّ تحديد معرّفات مختصة بمجال واحد؛ وذلك بالنسبة إلى مجالات تأدية الوظائف المشتملة على أسئلة متعددة (أداء الجزء العلوي من الجسم، والجزع، والاكنتاب). فمثلاً، يوجد سؤالان متعلقان بتأدية الوظائف للجزء العلوي من الجسم، وكل منهما يستحث حركات محددة ومميزة: أي مدى الصعوبة في رفع قنينة ماء من الخصر إلى مستوى العينين (الذراعين / الكتفين)، ومدى الصعوبة في استخدام اليدين والأصابع. وقد خضع السؤالان للتحليل والضم لإنتاج مؤشر واحد متعلق بالجزء العلوي من الجسم مقترناً بأربعة مستويات من الصعوبة تتراوح بين 1 (صعوبة منخفضة) إلى 4 (صعوبة كبيرة) – أي على غرار فئات الإجابات المقدمة للأسئلة المنفردة في المجموعة القصيرة: لا توجد صعوبة، توجد بعض الصعوبة، توجد صعوبة كبيرة، ولا يمكنني القيام بذلك على الإطلاق. وعلى شاكلة مجال "الجزء العلوي من الجسم"، تمتاز مجالات "المجموعة الموسعة" (الإدراك، والجزع، والاكنتاب، والألم، والتعب) بأنماط إجابات مختلفة لا 'ترتقي' سريعاً إلى نمط معتاد للإجابة وفق معايير الفريق. اختُصت مجالات تأدية الوظائف تلك بإصدار نمط إجابات مماثل رباعي المستويات على هيئة المستوى 1 إلى المستوى 4، حيث (1) يعني المستوى الأدنى من الصعوبة، و(4) يعني المستوى الأعلى من الصعوبة.

ثانياً، روعيت مؤشرات المجالات الفردية للوقوف على الحد المناسب للإدراج ضمن المعرف الكلي للإعاقة – أي لأغراض تقدير الانتشار وتفصيل مؤشرات المخرجات حسب حالة الإعاقة.

ملحوظة:

بالنسبة إلى كل المتغيرات، تُدوّن الرموز (7) أرفض الإجابة، و(8) غير متأكد، و(9) لا أعرف ضمن فئة مفقود.

SPSS WG-SS Enhanced Syntax Annotated with Output Tables

Actual SPSS syntax is indented and the commands are in **BOLD text**.

NOTE: For data analysis, use your standard weighting and estimation techniques.

The syntax below produces **frequency distributions** on individual domain questions – **cross-tabulations** on multiple domain questions, and calculates INDICATOR variables for domains with multiple questions – for use in the determination of disability identifiers.

Step 1: Generate frequency distributions on each of the six WG-SS domain variables.

FREQUENCIES VIS_SS HEAR_SS MOB_SS COM_SS SC_SS COG_SS.

VISION: VIS_SS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	13690	79.0	81.6	81.6
	Some difficulty	2708	15.6	16.2	97.8
	A lot of difficulty	333	1.9	2.0	99.8
	Cannot do at all	36	.2	.2	100.0
	Total	16767	96.8	100.0	
Missing		559	3.2		
Total		17326	100.0		

HEARING: HEAR_SS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	13680	79.0	81.6	81.6
	Some difficulty	2753	15.9	16.4	98.0
	A lot of difficulty	310	1.8	1.8	99.9
	Cannot do at all	23	.1	.1	100.0
	Total	16766	96.8	100.0	
Missing		560	3.2		
Total		17326	100.0		

MOBILITY: MOB_SS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	13424	77.5	80.1	80.1
	Some difficulty	2165	12.5	12.9	93.0
	A lot of difficulty	792	4.6	4.7	97.7
	Cannot do at all	380	2.2	2.3	100.0
	Total	16761	96.7	100.0	
Missing		565	3.3		
Total		17326	100.0		

COMMUNICATION: COM_SS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	15874	91.6	94.7	94.7
	Some difficulty	745	4.3	4.4	99.2
	A lot of difficulty	94	.5	.6	99.7
	Cannot do at all	43	.2	.3	100.0
	Total	16756	96.7	100.0	
Missing		570	3.3		
Total		17326	100.0		

SELF-CARE: SC_SS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	16029	92.5	95.7	95.7
	Some difficulty	544	3.1	3.2	98.9
	A lot of difficulty	114	.7	.7	99.6
	Cannot do at all	68	.4	.4	100.0
	Total	16755	96.7	100.0	
Missing		571	3.3		
Total		17326	100.0		

COGNITION: COG_SS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	13719	79.2	81.9	81.9
	Some difficulty	2632	15.2	15.7	97.6
	A lot of difficulty	382	2.2	2.3	99.9
	Cannot do at all	20	.1	.1	100.0
	Total	16753	96.7	100.0	
Missing		573	3.3		
Total		17326	100.0		

UPPER BODY

Step 2. Generate frequency distributions and cross-tabulations for Upper body domain questions and determine the Upper Body Indicator.

UB_1 is Difficulty raising 2 liter bottle of water from waist to eye level.

UB_2 is Difficulty using hands and fingers

First, calculate frequency distributions on the two extended set questions.

FREQUENCIES UB_1 UB_2.

UB_1: Diff raising 2 liter bottle of water from waist to eye level

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	15677	90.5	93.6	93.6
	Some difficulty	743	4.3	4.4	98.0
	A lot of difficulty	167	1.0	1.0	99.0
	Cannot do at all	166	1.0	1.0	100.0
	Total	16753	96.7	100.0	
Missing		573	3.3		
Total		17326	100.0		

UB_2: Degree of difficulty using hands and fingers

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	No difficulty	15199	87.7	90.7	90.7
	Some difficulty	1229	7.1	7.3	98.1
	A lot of difficulty	255	1.5	1.5	99.6
	Cannot do at all	70	.4	.4	100.0
	Total	16753	96.7	100.0	
Missing		573	3.3		
Total		17326	100.0		

Step 3. Generate a cross-tabulation of the two Upper body Extended Set questions: UB_2 and UB_1.

The syntax below produces a cross-tabulation of the two Extended Set questions: UB_1: *Difficulty raising a 2 liter bottle of water from waste to eye level* UB_2: *Difficulty using hands and fingers to determine a single UPPER BODY INDICATOR (UB_INDICATOR)*.

CROSSTABS UB_2 BY UB_1.

UB_2: Difficulty using hands and fingers		UB_1: Diff raising 2 liter bottle of water from waist to eye level				Total
		No difficulty	Some difficulty	A lot of difficulty	Cannot do at all	
Degree of difficulty using hands and fingers	No difficulty	14786	309	58	44	15197
	Some difficulty	782	355	51	40	1228
	A lot of difficulty	98	73	51	33	255
	Cannot do at all	9	5	7	49	70
Total		15675	742	167	166	16750

Step 4. Create an UPPER BODY INDICATOR (UB_INDICATOR) based on the two additional upper body questions UB_2 and UB_3.

Syntax below creates UB_INDICATOR based on the distribution in the cross-tabulation above.

COMPUTE UB_INDICATOR = 0.

IF (UB_1 = 4 OR UB_2 = 4) UB_INDICATOR = 4.

IF UB_INDICATOR NE 4 AND (UB_1 = 3 OR UB_2 = 3) UB_INDICATOR = 3.

IF UB_INDICATOR NE 4 AND UB_INDICATOR NE 3 AND (UB_1 = 2 OR UB_2 = 2) UB_INDICATOR = 2.

IF UB_INDICATOR NE 4 AND UB_INDICATOR NE 3 AND UB_INDICATOR NE 2 AND (UB_1 = 1 OR UB_2 = 1) UB_INDICATOR = 1.

FREQUENCIES UB_INDICATOR.

	UB_INDICATOR			
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	14790	85.4	88.3
	2.00	1448	8.4	8.6
	3.00	331	1.9	2.0
	4.00	187	1.1	1.1
	Total	16756	96.7	100.0
Missing	570	3.3		
Total	17326	100.0		

ANXIETY

Step 5. Generate frequency distribution on ANX_1.

First, calculate frequency distributions on ANX_1: *How often do you feel worried, nervous or anxious?*

FREQUENCIES ANX_1.

ANX_1: How often feel worried, nervous, or anxious?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Daily	1632	9.4	9.8	9.8
	Weekly	1872	10.8	11.2	21.0
	Monthly	1558	9.0	9.3	30.4
	A few times a year	4898	28.3	29.4	59.7
	Never	6714	38.8	40.3	100.0
	Total	16674	96.2	100.0	
Missing		652	3.8		
Total		17326	100.0		

Step 6. The syntax below recodes ANX_3 into ANX_3Y

- 1) to create a NOT ASKED category based on those who responded NEVER to ANX_1 and
- 2) to place "SOMEWHERE BETWEEN" numerically in-between "A LITTLE" and "A LOT".

IF (ANX_1 = 5) ANX_3Y = 0.

RECODE ANX_3 (SYSMIS=SYSMIS) (1=1) (2=3) (3=2) (ELSE=9) INTO ANX_3Y.

FREQUENCIES ANX_3Y.

ANX_3Y: Level of feelings last time felt worried/nervous/anxious

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Not asked	6714	38.8	40.3	40.3
	A little	5700	32.9	34.2	74.5
	In between a little and a lot	3076	17.8	18.5	92.9
	A lot	1176	6.8	7.1	100.0
	Total	16666	96.2	100.0	
Missing		660	3.8		
Total		17326	100.0		

Step 7. Generate a cross-tabulation of the anxiety Extended Set questions: ANX_1 and ANX_3Y.

The syntax below produces a cross-tabulation of ANX_1: *How often you felt worried, nervous or anxious* (a measure of frequency) and ANX_3Y: *The level of those feeling the last time you felt worried, nervous or anxious* (a measure of intensity) – used to determine a single ANXIETY INDICATOR (ANX_INDICATOR).

CROSSTABS ANX_3Y BY ANX_1.

ANX_3Y: Level of feelings last time felt worried, nervous or anxious	ANX_1: How often feel worried, nervous or anxious?					
	Daily	Weekly	Monthly	A Few Times A Year	Never	Total
Not asked	0	0	0	0	6714	6714
A little	489	887	897	3417	0	5690
In between a little and a lot	589	725	535	1221	0	3070
A lot	548	256	123	248	0	1175
Total	1626	1868	1555	4886	6714	16649

Step 8. Create an ANXIETY INDICATOR (ANX_INDICATOR) based on the two anxiety questions ANX_1 and ANX_3Y.

Syntax below creates ANX_INDICATOR based on the distribution in the cross-tabulation above.

COMPUTE ANX_INDICATOR = 0.

IF (ANX_3Y LE 4 AND (ANX_1 = 4 OR ANX_1 = 5)) ANX_INDICATOR=1.

IF ((ANX_1 = 3) OR (ANX_1 LT 3 AND ANX_3Y=1) OR (ANX_1 = 2 AND ANX_3Y = 2)) ANX_INDICATOR = 2.

IF ((ANX_1 = 1 AND ANX_3Y = 2) OR (ANX_1 = 2 AND ANX_3Y = 3)) ANX_INDICATOR = 3.

IF (ANX_1 = 1 AND ANX_3Y = 3) ANX_INDICATOR = 4.

IF (ANX_1 = 9 OR ANX_3Y = 9) ANX_INDICATOR=9.

VALUE LABELS ANX_INDICATOR 0 'N/A' 9 "DON'T KNOW".

FREQUENCIES ANX_INDICATOR.

ANX_INDICATOR					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	11600	67.0	69.7	69.7
	2.00	3656	21.1	22.0	91.6
	3.00	845	4.9	5.1	96.7
	4.00	548	3.2	3.3	100.0
	Total	16649	96.1	100.0	
Missing		677	3.9		
Total		17326	100.0		

DEPRESSION

Step 9. Generate frequency distribution on DEP_1.

First, calculate frequency distributions on DEP_1: *How often do you feel depressed?*

FREQUENCIES DEP_1.

DEP_1: How often do you feel depressed?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Daily	756	4.4	4.5	4.5
	Weekly	926	5.3	5.6	10.1
	Monthly	1038	6.0	6.2	16.3
	A few times a year	4012	23.2	24.1	40.4
	Never	9929	57.3	59.6	100.0
	Total	16661	96.2	100.0	
Missing		665	3.8		
Total		17326	100.0		

Step 10. The syntax below recodes DEP_3 into DEP_3Y

- 1) to create a NOT ASKED category based on those who responded NEVER to DEP_1 and
- 2) to place "SOMEWHERE BETWEEN" numerically in-between "A LITTLE" and "A LOT".

IF (DEP_1 = 5) DEP_3Y = 0.

RECODE DEP_3 (SYSMIS=SYSMIS) (1=1) (2=3) (3=2) (ELSE=9) INTO DEP_3Y.

FREQUENCIES DEP_3Y.

DEP_3Y: Level of feelings last time felt depressed

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Not asked	9929	57.3	59.6	59.6
	A little	3775	21.8	22.7	82.3
	In between a little and a lot	2016	11.6	12.1	94.4
	A lot	935	5.4	5.6	100.0
	Total	16655	96.1	100.0	
Missing		671	3.9		
Total		17326	100.0		

Step 11. Generate a cross-tabulation of the depression Extended Set questions: DEP_1 and DEP_3Y.

The syntax below produces a cross-tabulation of DEP_1: *How often do you feel depressed* (a measure of frequency) and DEP_3Y: *The level of those feeling the last time you felt depressed* (a measure of intensity) – used to determine a single DEPRESSION INDICATOR (DEP_INDICATOR).

CROSSTABS DEP_3Y BY DEP_1.

DEP_3Y: Level of feelings last time felt depressed	DEP_1: How often do you feel depressed?					Total
	Daily	Weekly	Monthly	A Few Times A Year	Never	
Not asked	0	0	0	0	9929	9929
A little	161	346	548	2708	0	3763
In between a little and a lot	209	384	378	1042	0	2013
A lot	381	191	112	248	0	932
Total	751	921	1038	3998	9929	16637

Step 12. Create a DEPRESSION INDICATOR (DEP_INDICATOR) based on the two depression questions DEP_1 and DEP_3Y.

Syntax below creates DEP_INDICATOR based on the distribution in the cross-tabulation above.

COMPUTE DEP_INDICATOR = 0.

IF (DEP_3Y LE 4 AND (DEP_1 = 4 OR DEP_1 = 5)) DEP_INDICATOR=1.

IF ((DEP_1 = 3) OR (DEP_1 LT 3 AND DEP_3Y=1) OR (DEP_1 = 2 AND DEP_3Y = 2))
DEP_INDICATOR = 2.

IF ((DEP_1 = 1 AND DEP_3Y = 2) OR (DEP_1 = 2 AND DEP_3Y = 3)) DEP_INDICATOR = 3.

IF (DEP_1 = 1 AND DEP_3Y = 3) DEP_INDICATOR = 4.

IF (DEP_1 = 9 OR DEP_3Y = 9) DEP_INDICATOR = 9.

VALUE LABELS DEP_INDICATOR 0 'N/A' 9 "DON'T KNOW".

FREQUENCIES DEP_INDICATOR.

		DEP_INDICATOR			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	13927	80.4	83.7	83.7
	2.00	1929	11.1	11.6	95.3
	3.00	400	2.3	2.4	97.7
	4.00	381	2.2	2.3	100.0
	Total	16637	96.0	100.0	
Missing		689	4.0		
Total		17326	100.0		

Creating Disability Status Indicator for the WG-SS Enhanced

WG-SS Enhanced: WG-SS + Upper Body-indicator + Anxiety (level 4) + Depression (level 4)

The syntax below calculates the WG Short Set ENHANCED Disability Indicator (**SS_E**) based on the 12 questions at the recommended cut-off. The level of inclusion is: at least 1 domain/question is coded A LOT OF DIFFICULTY or CANNOT DO AT ALL for the six short set question; severity levels 3 or 4 for the Upper body-Indicators; and severity level 4 for Anxiety- and Depression-Indicators.

COMPUTE SS_E = 0.

IF (MISSING(VIS_SS) AND MISSING(HEAR_SS) AND MISSING(MOB_SS) AND MISSING(COM_SS) AND MISSING(SC_SS) AND MISSING(COG_SS) AND MISSING(UB_INDICATOR) AND MISSING(ANX_INDICATOR) AND MISSING(DEP_INDICATOR)) SS_E = 9.

IF ((VIS_SS = 3 OR VIS_SS = 4) OR (HEAR_SS= 3 OR HEAR_SS = 4) OR (MOB_SS= 3 OR MOB_SS = 4) OR (COM_SS= 3 OR COM_SS = 4) OR (SC_SS = 3 OR SC_SS = 4) OR (COG_SS = 3 OR COG_SS = 4) OR (UB_INDICATOR = 3 OR UB_INDICATOR = 4) OR ANX_INDICATOR = 4 OR DEP_INDICATOR = 4) SS_E = 1.

RECODE SS_E (9=SYSMIS).

FREQUENCIES SS_E.

SS_E: WG-SS Enhanced Disability Indicator based on 9 domains and 12 questions

		Frequency	Percent	Valid Percent	Weighted Estimate*
Valid	WITHOUT DISABILITY	14393	83.1	85.8	87.7
	WITH DISABILITY	2384	13.8	14.2	12.3
	Total	16777	96.9	100.0	
Missing		549	3.2		
Total		17326	100.1		

*Weighted estimate provided – but is not part of the SPSS syntax.